Sortenblatt

Falchs Gulderling

Herkunft

Kreuzung unbekannt, Anfang 1900 in Schwaz in Tirol gefunden, war damals in Tirol weit verbreitet



Synonyme

Tratzberger Findling

Agronomisches Profil

Blüte: früh, diploid Wachstum: stark Anfälligkeit: n. v.

Ertragsleistung: mittlerer Ertrag, neigt zu Alternanz, neigt nicht zu Vorerntefruchtfall

Erntezeitpunkt: 2-0 Wochen vor Golden Delicious

Frucht

Größe und Form: groß, kugel-kegelförmig, abgeplattet kugelförmig, rechteckig

Grund- und Deckfarbe: grüne Grundfarbe; dunkelrote, gestreifte, geflammte Deckfarbe; hoher

Deckfarbenanteil (75 %)

Anfälligkeit Berostung: geringe Berostung in Kelch und/oder Stielgrube (<5%)

Fruchtfleischfestigkeit: 8,8-9,3 kg/cm² zur Ernte Neigung zur Verbräunung des Fruchtfleisches: n. v.

Zuckergehalt: 11,1-11,8 °Brix zur Ernte **Säuregehalt:** 6,4-8,4 g/L MA zur Ernte

Spezifisches Gewicht:

Polyphenolgesamtgehalt1: n. v.

TAC1: n. v.

Anthocyangehalt2: n. v.



^{2 -} nur bei rotfleischigen Sorten





Vitamin C¹: n. v.
Pektine¹: n. v.
Geschmack: n. v.
Lagerung: n. v.

Besonderheiten: n. v.

Saftherstellung

Ausbeute: n. v.

Stabilität der Farbe: n. v.

Zuckergehalt: n. v. Säuregehalt: n. v. pH Wert: n. v.

Polyphenolgesamtgehalt: n. v.

TAC: n. v.

Anthocyangehalt²: n. v.

Vitamin C: n. v.





^{2 -} nur bei rotfleischigen Sorten