### Sortenblatt

# Roter Palmapfel

#### Herkunft

Kreuzung unbekannt, Herkunft unbekannt



## **Synonyme**

n. v.

### **Agronomisches Profil**

Blüte: mittel, diploid Wachstum: mittel Anfälligkeit: n. v.

Ertragsleistung: geringer Ertrag, neigt nicht zu Alternanz, neigt zu Vorerntefruchtfall

Erntezeitpunkt: 2-0 Wochen vor Golden Delicious

#### Frucht

Größe und Form: klein, kegelförmig, rechteckig kegelförmig

Grund- und Deckfarbe: grüngelbe Grundfarbe; dunkelrote, kompakte, gestreifte, verwaschene

Deckfarbe; extrem hoher Deckfarbenanteil (100 %)

**Anfälligkeit Berostung:** geringe Berostung in Kelch und/oder Stielgrube (<5%)

Fruchtfleischfestigkeit: 10,5-11,2 kg/cm² zur Ernte Neigung zur Verbräunung des Fruchtfleisches: n. v.

**Zuckergehalt:** 10,9-11,8 °Brix zur Ernte **Säuregehalt:** 6,2-7,4 g/L MA zur Ernte

Spezifisches Gewicht: 0,82 Polyphenolgesamtgehalt¹: n. v.

TAC1: n. v.

Anthocyangehalt<sup>2</sup>: n. v.



<sup>2 -</sup> nur bei rotfleischigen Sorten





Vitamin C¹: n. v. Pektine¹: n. v. Geschmack: n. v. Lagerung: n. v.

Besonderheiten: n. v.

## **Saftherstellung**

Ausbeute: n. v.

Stabilität der Farbe: n. v.

Zuckergehalt: n. v. Säuregehalt: n. v.

**pH Wert:** n. v.

Polyphenolgesamtgehalt: n. v.

TAC: n. v.

Anthocyangehalt<sup>2</sup>: n. v.

Vitamin C: n. v.





<sup>1 -</sup> nach 2-monatiger Lagerung im normalen Kühllager

<sup>2 -</sup> nur bei rotfleischigen Sorten