Sortenblatt

Weberbartlapfel

Herkunft

Zufallssämling, in St. Marienkirchen, Oberösterreich entstanden, dort lokal verbreitet



Synonyme

n. v.

Agronomisches Profil

Blüte: spät, diploid Wachstum: mittel Anfälligkeit: n. v.

Ertragsleistung: mittlerer Ertrag, neigt nicht zu Alternanz, neigt zu Vorerntefruchtfall

Erntezeitpunkt: 0-2 Wochen nach Golden Delicious

Frucht

Größe und Form: mittel, schmal kegelförmig, stumpf kegelförmig

Grund- und Deckfarbe: grüngelbe Grundfarbe; keine Anfälligkeit Berostung: leichte Berostung der Furcht Fruchtfleischfestigkeit: 11,4-12,6 kg/cm² zur Ernte Neigung zur Verbräunung des Fruchtfleisches: n. v.

Zuckergehalt: 13,1-15,2 °Brix zur Ernte **Säuregehalt:** 8,6-9,6 g/L MA zur Ernte

Spezifisches Gewicht: 0,81 Polyphenolgesamtgehalt¹: n. v.

TAC1: n. v.

Anthocyangehalt2: n. v.

Vitamin C1: n. v.



^{2 -} nur bei rotfleischigen Sorten





Pektine¹: n. v. Geschmack: n. v. Lagerung: n. v.

Besonderheiten: n. v.

Saftherstellung

Ausbeute: n. v.

Stabilität der Farbe: n. v.

Zuckergehalt: n. v. Säuregehalt: n. v. pH Wert: n. v.

Polyphenolgesamtgehalt: n. v.

TAC: n. v.

Anthocyangehalt²: n. v.

Vitamin C: n. v.





^{2 -} nur bei rotfleischigen Sorten